



薬業
処方箋医薬品 注意—医師等の処方箋により使用すること
持続性ソマトスタチナナログ マイクロスフェア型徐放性製剤 [薬価基準収載]
シグニフォー®LAR® 筋注用キット
Signifor® LAR kit 10mg, 20mg, 30mg, 40mg, 60mg
パシレオチドバモ酸塩徐放性製剤

医療関係者用



調製及び注射方法

キット梱包内容

準備するもの	注射針(20ゲージ)1本 ※その他、必要に応じて、予備用注射針や消毒用アルコール綿等をご準備下さい。
シグニフォー®LAR®筋注用 (バイアル)	ブリスタートレー フィルム キャップ 調製用バイアル アダプター 専用分散液(シリジン)
注意	・再使用しないで下さい。 ・包装や製品に破損等がみられる場合は使用しないで下さい。
使用前の注意	<ul style="list-style-type: none"> 使用前にはシグニフォー®LAR®筋注用(バイアル)および専用分散液(シリジン)を最低30分室温で静置して下さい。室温に戻した後24時間以内の使用が望されます。 調製は必ず付属の専用分散液およびバイアルアダプターを使用して下さい。 用時調製し、懸濁後は直ちに使用して下さい。



1 バイアルを開ける



2 専用分散液のセット




3 専用分散液の充てん



4 薬液の攪拌



5 吸引・針取り付け



6 注射位置



7 注射

• プランジャーを押し下げたままの状態で、粉末が完全に懸濁するまで、**水平方向に穏やかに振って下さい(約30秒間)**。懸濁が不十分な場合はさらに30秒間、穏やかに振ります。
※この時までに、患者さんには**側臥位の姿勢**で待機してもらうのが望ましいです。

• シリンジとバイアルを逆さにし、プランジャーをゆっくり引いて、全内容物をバイアルからシリンジに吸引して下さい。

• 注射針をシリンジに回しながら取り付けて下さい。
• シリンジ内での沈殿を避け均一な懸濁液を保つため、**シリンジを静かに振って下さい**。
• シリンジ内の空気を抜き、**直ちに注射して下さい**。

• 左右いずれかの臀部注射部位をアルコール綿で消毒し、筋肉内に全量を注射して下さい。
• 注射針は刺入部位に対し90度の角度で注射して下さい。
• 静脈内には注射しないで下さい。
! 左右交互に注射して同一部位への投与は避けて下さい。
! 側臥位の姿勢で注射して下さい。

• 側臥位の患者さんにほぼ水平に注射します。
• 患者さんに激痛やしびれがないか聞いてから、プランジャーを一旦引いて血液が逆流しないことを確認して下さい。血液の逆流が認められなければ一定の圧力で注入します。
! 注射後は、注射部位をもまないで下さい。